

품 목	오큐카르핀 점안액 설명서	
전체규격	111 × 176	(mm)
도 수	1도	■ K
폰트규격	8	(point)
변경사항	① 전성분 표시 ② 삼일 CI 및 본사 주소 삭제 ③ 효능효과 주의문구 삭제 ④ 판매원 변경 (삼일엘리간 → 삼일제약) ⑤ 소비자상담전화, 홈페이지 변경	

파마코드 : 17번



※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

전문의약품

오큐카르핀® 점안액 2%

(필로카르핀염산염)

PL00101-2017-1	
의 약 품	1 3 1
분류번호	안과용제

【원료약품의 분량】 1mL 중
 유효성분 : 필로카르핀염산염(KP) 20mg
 첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물액10%(KP) 1mg
 (벤잘코늄염화물로서 0.1mg)
 첨가제 : 봉산, 시트르산나트륨수화물, 염산, 염화나트륨, 주사용수, 히프로멜로우스2910

【성상】 무색 투명한 수용성 점안액

【작용】 * 액리 : 필로카르핀염산염은 부교감신경물질로서 눈에 국소점적시 축동작용을 나타내고 방수의 유출을 증대시켜 안압을 감소시킨다.

【효능·효과】 녹내장, 진단 또는 치료를 목적으로 하는 축동

【용법·용량】 1회 1~2방울 1일 3~5회 점안(눈에 넣음)한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 흉채염 환자(흉동에 의해 흉채의 유착(부착)을 일으킬 수 있고 또한 염증을 악화시킬 수 있다)
- 2) 이 악 성분에 과민증 환자
- 3) 악성 녹내장과 모든 수정체성 속발성(이차) 녹내장 환자
- 4) 동공협착 녹내장 환자
- 5) 각막 훼손 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 기관지천식 환자(천식발작을 악화시킬 수 있다.)
- 2) 망막 박리(벗겨짐)의 위험이 있는 환자
- 3) 심부전증 환자
- 4) 갑상선 기능亢진증 환자
- 5) 장폐색 등 소화관 협착 환자
- 6) 심이지장 궤양 환자
- 7) 요로장애로 인한 요로폐색 환자
- 8) 변비로 인한 배변장애 환자
- 9) 파킨슨병 환자
- 10) 소아
- 11) 근시 환자

3. 이상반응

- 전신증상이 나타나는 경우는 투여를 중지하고 아트로핀황산염수화물의 투여 등 적절한 처치를 한다.
- 1) 과민증 : 안경염(눈꺼풀염), 가려움 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 눈 : 드물게 백내장, 결막충혈 등의 증상이 나타나는 수가 있다. 눈물분비의 증가, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 표면 각막염, 일시적인 근시의 원근조절장애, 작렬감(화끈감), 모양체 연축(수축과 이완), 안외(눈주변)위의 두통 등이 나타날 수 있다. 녹내장 치료에 의해 각막 육아가 생길 수 있다. 고령자(노인)나 렌즈 혼탁(흐림)자에서 어두운 조명하에서 시력저하가 나타날 수 있다. 장기 사용 시 렌즈 혼탁(흐림), 망막 균열(갈라짐) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 착란, 기억장애 등의 정신증상이 나타났다는 보고가 있다.
 - 4) 순환기계 : 심부전증, 혈압증가 등이 나타날 수 있다.
 - 5) 호흡기계 : 폐 부종(부기)이 나타날 수 있다.
 - 6) 소화기계 : 설사, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 7) 기타 : 별현(땀이 납니다), 타액(침)분비, 근육약화가 나타날 수 있으며 처음 치료를 시작할 때 동공수축의 결과로 경미한(가벼운) 모양체 경련이 일어날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 축동이나 조절마비 등 시력에 영향을 미칠 수 있으므로 운전이나 기계 조작 시 주의 한다.
- 2) 콘택트렌즈 착용자는 이 약 투여전에 렌즈를 제거한다. 적어도 투여 30분 이후에 렌즈를 재착용한다.
- 3) 이 약은 암적응을 어렵게 할 수 있으므로 어두운 곳에서 주의한다.

5. 상호작용

- 1) 속사메토늄염화물수화물 계열의 근육이완제와 병용(함께 사용)하여 시 효과가 지속, 연장된다.
- 2) 큐라레 계열의 근육이완제와 병용(함께 사용)하여 시 효과가 감소한다.
- 3) 강심배당체와 병용(함께 사용)하여 시 혼동효과가 지속되고 맥박이 감소한다.
- 4) 퀴니딘과 프로카인아미드와 병용(함께 사용)하여 시 부교감신경 자극제의 반응력이 감소한다.
- 5) 다른 축동제, 베타차단제, 탄산 탈수소 효소 저해제(억제제), 교감신경 효능제 또는 과삼 투압제와 병용(함께 사용)하여 할 수 있다.
- 6) 외과수술 시 이 약은 마취제의 효력을 증강시킬 수 있으므로 사용을 피한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 자궁 근육수축을 일으킬 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 모유로의 이행여부는 알려지지 않았으나 많은 약들이 이행하므로 수유부에는 주의하여 투여한다.

7. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 주의한다.

8. 적용상의 주의

- 1) 점안(눈에 넣음) 시 원칙적으로 환자는 옆으로 누운 상태에서 눈꺼풀을 들어 결막낭(결막주머니)내에 점안(눈에 넣음)하고, 1~5분간 눈을 감았다가 누방부를 압박시킨 후 눈을 뜨다.
- 2) 점안(눈에 넣음)으로만 사용한다.
- 3) 점안(눈에 넣음) 시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
- 4) 차광을 위해 사용 즉시 포장에 넣는다.
- 5) 위생상 한번 개봉한 것은 1개월 이상 사용하지 않는다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록(습기가 적은)서늘한 곳에(밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관한다.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[포장단위] 10mL/병

[저장방법] 차광·기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 3년

※ 점안(눈에 넣음) 시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적 하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

※ 차광유지를 위해 반드시 제품상자에 보관하십시오.

※ 다른 사람들과 함께 사용하지 마십시오.

※ 환기가 잘되는 청결한 장소에 보관하십시오.

* 이 첨부문서 작성(개정)년월 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자상담전화 : 080-520-3131

♣ 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

첨부문서 작성(개정)년월 : 2017년 8월

제조판매원 삼일제약|주

경기도 안산시 단원구 산단로 216, 반월공업단지 비 11-6